

# COVID-19: AANBEVELING VOOR ZORGPERSONEEL IN COLLECTIVITEITEN DIE IN HET KADER VAN EEN SCREENING WERDEN GETEST

Versie 10 april 2020

## 1. Context

Vanwege het risico op uitbraken van COVID-19 in collectiviteiten in België hebben de gezondheidsautoriteiten besloten om PCR-testen uit te voeren als screening bij bewoners en personeel van dergelijke instellingen.

Omdat deze tests kunnen leiden tot de identificatie van geïnfecteerde personeelsleden, die niet ziek zijn, werd de huidige richtlijn opgesteld.

## 2. Maatregelen

**Elk personeelslid van een collectiviteit past te allen tijde de preventie- en persoonlijke beschermingsmaatregelen toe zoals beschreven in de procedures van de autoriteiten.**

### Asymptotisch zorgpersoneel met een negatieve PCR test

- De gewone activiteiten kunnen worden verder gezet, met toepassing van de maatregelen zoals beschreven in de procedures voor de instelling.

### Asymptotisch zorgpersoneel met een positieve PCR test

- De persoon moet 7 dagen in thuisisolatie blijven.
- Indien de beschikbaarheid van personeel beperkt is, kan de persoon verder werken mits het dragen van een masker en een verscherpte handhygiëne, maar enkel op een COVID afdeling.
- De gezondheidstoestand moet nauw opgevolgd worden (zelfmonitoring). Indien er symptomen van COVID-19 optreden gelden de maatregelen voor een symptomatische persoon<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Een positief resultaat bij een asymptotische persoon kan betekenen dat hij/zij :

1/ in contact kwam met het virus, zonder dat dit inhoudt dat het virus levend is en de persoon besmettelijk is  
2/ zich in de prodromale fase bevindt

## Symptomatisch zorgpersoneel met een negatieve PCR test

- De gewone activiteiten kunnen worden verder gezet, met toepassing van de maatregelen zoals beschreven in de procedures van de instelling.

## Symptomatisch zorgpersoneel met een positieve PCR test

- Een personeelslid **in contact met mensen die risico lopen een ernstige vorm van COVID-19 te ontwikkelen**, dat symptomen van een acute luchtweginfectie vertoont en/of ontwikkelt met een positieve PCR-test :
  1. blijft in thuisisolatie voor een minimum van 7 dagen na aanvang van de symptomen EN tot ten minste 3 dagen zonder koorts EN met verbetering van de ademhalingssymptomen<sup>2</sup>;
  2. draagt bij de terugkeer naar het werk te allen tijde een chirurgisch masker in de instelling totdat de symptomen volledig zijn verdwenen EN ten minste 14 dagen na het optreden van de symptomen.
- Voor zorgpersoneel zonder contact met mensen die risico lopen een ernstige vorm van COVID-19 te ontwikkelen gelden de algemene maatregelen: thuisisolatie gedurende minimaal 7 dagen of langer totdat verbetering van de ademhalingssymptomen<sup>3</sup>.

Basis hygiënemaatregelen : zie richtlijn [basishygiëne](#).

---

<sup>2,3</sup> Totdat de infectieuze symptomen zijn verdwenen, zoals beoordeeld door de behandelende arts. Een post-infectieuze (reactieve) hoest kan bijvoorbeeld aanhouden.